



Lista de Vacunas para Adolescentes 11-19 Años de Edad

Línea de Información:
1-800-275-0659
www.immunize-utah.org

VACUNA	DOSIS	TIEMPO DE INMUNIZACIONES
Hepatitis B (Hep B) ¹	3 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 1 mes después de la 1ra. dosis 3ra. dosis 4-6 meses después de la 2da. dosis
Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR) ²	2 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 1 mes después de la 1ra. dosis
Tétanos, Difteria (Td) ³	1 dosis	Dosis de refuerzo a los 11-12 años de edad Cada 10 años en lo sucesivo
Varicela ⁴	2 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 1-3 meses después de la primera dosis dependiendo de la edad.
Hepatitis A (Hep A) ⁵	2 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 6-12 meses después de la 1ra. dosis
Gripe ⁶	1 dosis	1 dosis anualmente para adolescentes en alto riesgo
Neumocócica Polisacárida (PPV) ⁷	1 dosis	1 dosis para adolescentes en alto riesgo
Meningocócica ⁸	1 dosis	1 dosis es recomendada para adolescentes de 11-12 años de edad, al momento de ingresar al high school (aproximadamente a los 15 años), y para estudiantes universitarios que viven en dormitorios de las universidades
Tosferina (Tdap) ⁹	1 dosis	1 dosis Tdap es recomendada en adolescentes 11-12 años de edad
Virus del Papiloma Humano (VPH) ¹⁰	3 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 2 meses después de la 1ra. dosis 3ra. dosis 6 meses después de la 1ra. dosis

Vea en el lado al reverso para recomendaciones más detalladas

1. Hepatitis B: Tres dosis de la vacuna de hepatitis B son necesarias para una protección suficiente. Una vacuna de dos dosis de Hepatitis B están disponibles para adolescentes de 11 a 15 años de edad.

2. Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR en inglés): Se recomiendan dos dosis de la vacuna MMR para una protección total en personas de 7 a 18 años de edad las cuales no han sido vacunadas previamente. La vacuna MMR no debe de ser dada a adolescentes que ya estén embarazadas o que o que estén considerando quedarse o salir embarazadas al mes siguiente de la vacunación.

3. Tétanos, Difteria (Td en inglés): El refuerzo Td es recomendado a los 11-12 años de edad. A partir de entonces, la dosis de refuerzo Td puede ser dada cada diez años.

4. Varicela (Chickenpox en inglés): La vacuna de la varicela es recomendada para cualquier persona que no haya padecido la enfermedad de la varicela o que no haya recibido la vacuna de la varicela. Para niños menores de 13 años se recomiendan dos dosis de la vacuna de la varicela espaciadas por un periodo de tres meses. Adolescentes de 13 años o mayores deben de recibir dos dosis espaciadas por un periodo de cuatro semanas. La vacuna de la varicela no debe de ser dada a adolescentes que ya estén embarazadas o que o que estén considerando quedarse o salir embarazadas al mes siguiente de la vacunación.

5. Hepatitis A: Vive usted en una comunidad con muchos casos de hepatitis A? Viaja fuera de los Estados Unidos? Padece de un factor de desorden de coagulación o hepatitis crónica? Es un hombre que tiene sexo con otros hombres? Se aplica drogas? Si contestó **SI** a cualquiera de éstas preguntas, usted necesitará una vacuna de hepatitis A.

6. Gripe (Flu en inglés): Una vacuna anual contra el gripe es recomendada para cualquier persona con un serio problema de salud tales como asma, diabetes o padecimiento del corazón o cualquier persona que quiera evitar el gripe.

7. Neumocócica (Polisacárida): La vacuna PPV es recomendada para adolescentes con ciertas enfermedades serias tales como padecimiento del corazón, padecimiento de la enfermedad de células falciformes, enfermedad del pulmón, diabetes, leucemia, infección del VIH ó SIDA quienes están en gran riesgo de la enfermedad del neumocócica.

8. Meningocócica: La vacuna meningocócica es recomendada para adolescentes de 11-12 años de edad, que empiezan preparatoria (aproximadamente 15 años) o que van a entrar a la universidad y planean vivir en dormitorios de las universidades.

9. Tétanos, Difteria, Tosferina (Tdap en inglés): La vacuna Tdap es recomendada a los 11-12 años de edad y puede sustituir a la vacuna Td. Se recomienda una dosis de Tdap cinco años después de la última dosis Td/DTaP para adolescentes de 13 a 18 años de edad que no recibieron la dosis a los 11-12 años, pero que habían completado las series DTP/DTaP previamente.

10. Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV en inglés) : La vacuna VPH es la primera vacuna desarrollada para prevenir el cáncer de cuello de útero, lesiones genitales precancerosas y verrugas genitales causadas por ciertos tipos de VHP. La vacuna VHP es recomendada para mujeres de 11-12 años de edad. Para mujeres de 13 a 26 años que no hayan sido vacunadas con anterioridad o que no hayan completado toda la serie de vacunas, también se recomienda una vacuna de prevención.